

Su hijo puede haber estado expuesto a:

Virus Sincitial Respiratorio

Virus sincitial respiratorio (VSR) es una infección viral común

Si usted piensa que su hijo tiene RSV:

- Dígale a su proveedor de cuidado de niños o llame a la escuela.
- **¿Debe permanecer en casa al niño de la guardería o escuela?**
 - **Sí,** Hasta que la fiebre ha desaparecido y su hijo está lo suficientemente sano para actividades rutinarias
- **NO dé aspirina o medicamentos que contienen salicilato a nadie menor de 18 años de edad.**
- Por favor Nota: Antibióticos no funcionan para enfermedades causadas por un virus, incluyendo ciertas infecciones respiratorias.

Síntomas

- Su niño puede tener tos, ojos llorosos, moqueo o congestión o estornudos. Los síntomas pueden durar 7 días.
- Personas con severa RSV pueden sibilancias y/o congestión pulmonar. RSV puede ser grave para los bebés prematuros y las personas con problemas de corazón, pulmón o sistema inmune.
- Si su hijo está infectado puede tomar 2 to 8 days para los síntomas iniciar.

La infección se riega

- Por toser o estornudar.
- Por contacto con manos contaminadas, superficies u objetos.

Periodo Contagioso

- De 3 a 8 días. Algunos bebés pueden propagar RSV durante 4 semanas.

Llame a su proveedor de atención médica

- Si alguien en su casa tiene los síntomas. Su médico puede querer la prueba para el virus. Los niños que son hospitalizados se pueden tratar con medicamento especial llamado un fármaco antiviral.

Prevención

- Cubrir nariz y boca al toser y estornudar. Utilice un pañuelo o la manga. Dispone de pañuelos usados.
- Lávese las manos después de tocar cualquier cosa que podría estar contaminado con las secreciones de la boca o la nariz. Su niño puede necesitar ayuda con el lavado de manos.
- NO compartir recipientes de bebida y vasos o cubiertos. Lavar todos los platos con agua caliente y jabón entre cada uso.
- Limpie y desinfecte todo lo que entra en contacto con las secreciones de la nariz o la boca. Utilizar un producto que mata los gérmenes.
- Algunos bebés, incluso a los bebés que nacieron prematuramente, se pueden dar un medicamento para prevenir la infección. Hable con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, llame al Departamento de salud del distrito WEDCO.

- ❖ Centro de salud del Condado de Scott: 502-863-3971
- ❖ Centro de salud del Condado de Harrison: 859-234-2842
- ❖ Centro de salud del Condado de Nicholas: 859-289-2188

